

Рекомендации для родителей

При первых подозрениях на дизартрию у ребенка необходимо обратиться к специалистам:

- детскому неврологу,
- логопеду.

При несвоевременном выявлении и лечении дизартрии данное речевое расстройство приводит к проблемам в общении и обучении, а, в тяжелых случаях, к нарушениям адаптации ребенка в обществе.



Помните!

**Чем раньше выявлена
дизартрия, тем больше
шансов у ребенка стать
адаптированным
к жизни в обществе!**

Разработано Свердловским областным центром медицинской профилактики
по заказу Министерства социальной политики Свердловской области
в рамках реализации пилотного проекта по формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Министерство социальной политики Свердловской области
ГАУ "РЦ Ленинского района города Нижний Тагил"



**РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ
ПРИЗНАКОВ
ДИЗАРТРИИ
У ДЕТЕЙ**



Мамочкам приятно услышать первые звуки ребенка, начинающего говорить. Паника появляется, когда малыш подрастает, а речь остается невнятной.

Обнаруживается, что это симптомы серьезного заболевания со скрытыми последствиями - дизартрии.

Дизартрия – это расстройство речи вследствие нарушения иннервации речевого аппарата.

Причины дизартрии

- Воздействие различных неблагоприятных факторов на развивающийся мозг ребенка во внутриутробном и раннем периодах (влияние острых и хронических инфекций; токсикоз беременности; несовместимость по резус-фактору и др.);
- Инфекционные заболевания нервной системы в первые годы жизни ребенка.

Какие симптомы могут свидетельствовать о дизартрии?

- из-за слабости мышц, участвующих в произношении звуков речи, при открытом рте язык самопроизвольно вываливается наружу, губы слишком плотно сжаты или чересчур вялые и не смыкаются, наблюдается повышенное слюноотделение;

- ребенок испытывает сложности с жеванием и глотанием – «поперхивается» пищей;
- постоянно говорит в нос, хотя нет признаков гайморита и ринита;
- звуки в словах искажаются, заменяются на другие, пропускаются, причём не какой-то один определённый звук, а несколько или сразу все;
- нарушается речевое дыхание: к концу фразы речь «затухает», в середине предложения ребёнок может задохнуться, начать часто дышать;
- наблюдаются нарушения голоса: у детей, страдающих дизартрией, он слишком высокий и пискливый или глухой и «затухающий»;
- проблемы с мелодичностью речи: ребёнок не в состоянии изменять высоту тона, речь отличается монотонностью, поток слов слишком быстрый или чересчур замедленный.